

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (A Cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ขึ้นทะเบียนตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอป่าซางและ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย เป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (มกราคม พ.ศ. 2556 – ธันวาคม พ.ศ. 2557) จำนวน 3,760 หลังคาเรือน กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว หลังคาเรือนละ 1 คนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) จากการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 360 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านใช้วิธีการคำนวณขนาดตามสัดส่วน โดยการกำหนดเกณฑ์เป็นร้อยละของประชากร ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10% (จักรกฤษณ์ ดำรงใจ, 2558) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 374 คน ผู้ศึกษาจะนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ตามลำดับ ดังนี้

1. ข้อมูลทางด้านปัจจัยนำ

1.1 คุณลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวด้วยโรคไข้เลือดออก

1.2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

1.3 เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.4 การรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. ข้อมูลด้านปัจจัยเอื้อ

2.1 ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.2 การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

3. ข้อมูลด้านปัจจัยเสริม การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข หรือบุคคลใกล้ชิด

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

5. การทดสอบความสัมพันธ์

5.1 ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

5.2 ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางด้านปัจจัยนำ

1. ด้านคุณลักษณะทางประชากร ผู้ศึกษาวิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตาม คุณสมบัติที่กำหนด และได้วิเคราะห์รายละเอียดของคุณลักษณะทางประชากร ได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 จำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร

คุณลักษณะทางประชากร	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	201	53.70
หญิง	173	46.30
อายุ		
18 – 24 ปี	23	6.10
25 – 34 ปี	103	27.50
35 – 44 ปี	107	28.70
45 – 54 ปี	94	25.10
55 ปี-ขึ้นไป	47	12.60

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

คุณลักษณะทางประชากร	จำนวน	ร้อยละ
การศึกษาสูงสุด		
ประถมศึกษา	117	31.30
มัธยมศึกษาตอนต้น	69	18.40
มัธยมศึกษาตอนปลาย	70	18.70
อนุปริญญา	28	7.50
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	75	20.10
สูงกว่าปริญญาตรี	15	4.00
อาชีพ		
เกษตรกร	81	21.70
รับจ้าง	156	41.70
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	52	13.90
ค้าขาย	33	8.80
แม่บ้าน	10	2.70
ว่างงาน	7	1.90
อื่นๆ(นักเรียน นักศึกษา)	35	9.40
รายได้		
น้อยกว่า 5,000	14	3.70
5,000-10,000	180	48.10
10,000-15,000	59	15.80
15,000-20,000	79	21.10
มากกว่า 20,000	42	11.20
ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรค ไข้เลือดออก		
เคย	42	11.20
ไม่เคย	332	88.80

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะทางประชากร ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย ร้อยละ 53.70 มีกลุ่มอายุ 35-44 ปี มากที่สุด ร้อยละ 28.60 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 27.50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 31.30 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 20.10 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 41.70 รองลงมาคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 21.70 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.10 รองลงมาคือ 15,000 – 20,000 ร้อยละ 21.10 กลุ่มตัวอย่างหรือ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 88.80 ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมีเพียงร้อยละ 11.20 ที่เคยเป็นโรคนี้

2. ด้านความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 4.2 ระดับความรู้โดยรวม เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง

ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก	ระดับความรู้					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความรู้โดยรวม	116	31.00	227	60.70	31	8.30

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความรู้โดยรวม เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอบ้านนา จังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.70 และระดับสูง ร้อยละ 31.00

เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 จำนวนและค่าร้อยละของความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรค ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกรายข้อ

ความรู้	ใช่		ไม่ใช่	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. โรคไข้เลือดออกพบได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น	232	62.00	142	38.00
2. โรคไข้เลือดออกมียุงทุกชนิดเป็นพาหะ	290	77.50	84	22.50
3. โดยทั่วไปยุงลายจะวางไข่ในแหล่งน้ำที่มีลักษณะใสและนิ่ง	298	79.70	76	20.30
4. ยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกจะแพร่เชื้อไข้เลือดออกได้ตลอดชีวิตของยุงลาย	306	81.80	68	18.20
5. เวลาเด็กนอนตอนกลางวัน จำเป็นต้องนอนในห้องที่มีมุ้งลวด หรือกางมุ้ง หรือทายากันยุงเพื่อไม่ให้ยุงกัด	338	90.40	36	9.60
6. วิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	343	91.70	31	8.30
7. การใส่ทรายอะเบทในน้ำ สามารถไล่ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องขัดล้างภาชนะก่อน	91	24.30	283	75.70
8. การใส่น้ำส้มสายชู หรือ เกลือ ในจานรองขาตู้ สามารถป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้	302	80.70	72	19.30
9. การป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถคิดวัคซีนป้องกันได้	286	76.50	88	23.50
10. ปิดประตูหน้าต่าง นานอย่างน้อย 30 นาที หลังจากเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันภายในบ้าน	350	93.60	24	6.40

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นรายข้อพบว่า มีข้อที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดคือ ปิดประตูหน้าต่าง นานอย่างน้อย 30 นาที หลังจากเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันภายในบ้าน ร้อยละ 93.60 รองลงมาคือวิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการทำลายแหล่ง

เพาะพันธุ์กล้วย ร้อยละ 91.70 ส่วนข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ การใส่ทรายอะเบทในน้ำ สามารถใส่ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องขัดล้างภาชนะก่อน มีมากถึง ร้อยละ 75.70

3. ด้านทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับความคิดเห็นต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดังแสดงตามตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของระดับทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยรวม

ทัศนคติ	ระดับทัศนคติ		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม	3.88	0.76	สูง

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ระดับทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ที่ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)= 0.76

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำแนกเป็นรายชื่อ

ประเด็นทัศนคติ	ระดับทัศนคติ		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1.โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายต่อชีวิต	4.68	0.54	สูง
2.การสำรวจลูกน้ำยุงลาย เป็นหน้าที่ของ อสม.เท่านั้น	2.39	0.87	ปานกลาง
3.การใส่ทราย อะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของ อสม. แต่เพียงผู้เดียว	4.07	0.98	สูง
4.การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และทุกคนในชุมชน	4.63	0.85	สูง
5.การช่วยกันกำจัดยุงลาย /ลูกน้ำยุงลาย จะทำให้ท่านและเพื่อนบ้านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	4.58	0.71	สูง
6.การคว่ำภาชนะที่มีลูกน้ำ หรือการทำลายภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้	4.53	0.71	สูง
7.บ้านที่ไม่มีเด็กเล็กไม่จำเป็นต้องช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย	1.68	0.75	ต่ำ
8.การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสามารถทำได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งต้องทำพร้อมๆกันทุกหลังคาเรือน จึงจะได้ผลดี	4.51	0.64	สูง
รวม	3.88	0.76	สูง

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในข้อที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายต่อชีวิต อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.54 รองลงมาคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และทุกคนในชุมชน ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.85 ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือบ้านที่ไม่มีเด็กเล็กไม่จำเป็นต้องช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 1.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.75

4. ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรู้ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดังแสดงตามตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ระดับของการรับรู้ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม

การรับรู้	ระดับการรับรู้		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
การรับรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม	3.87	1.02	สูง

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.02

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของการรับรู้ทางสุขภาพในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกจำแนกเป็นรายข้อ

ประเด็นการรับรู้ทางสุขภาพ	ระดับการรับรู้		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1. ถ้าผู้เลี้ยงสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว ไปกัดเด็กคนอื่นๆ อีกจะทำให้เด็กคนนั้นป่วย เป็นโรคไข้เลือดออกได้	4.34	0.83	สูง
2. ผู้ที่เคยป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว โคนงูลาย กัดสามารถกลับ มาป่วยด้วยโรคนี้ได้	4.21	0.77	สูง
3. เวลากลางวันเปิดมุ้งลวดไว้ก็ได้เพราะไม่ค่อยมีุง	2.92	1.46	ปานกลาง
4. ในฤดูฝนมีแหล่งน้ำขังมาก ทุกคนจึงมีโอกาส ที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าในฤดู อื่นๆ	4.45	0.76	สูง
5. การที่ห้ามขุดล้างคูขี้ในภาชนะที่ใส่น้ำ ทุก 7 วันเป็นการป้องกันไม่ให้ไข่ของยุงลาย ติดตามภาชนะ	3.99	1.04	สูง
6. การใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่ใส่น้ำจะทำให้ เป็นอันตรายกับผู้ใช้อาจถึงแก่ชีวิตได้	2.86	1.35	ปานกลาง
7. การกางมุ้งให้เด็กนอนเวลากลางวันเป็นเรื่อง ที่สำคัญต้องปฏิบัติเป็นประจำ	4.51	0.67	สูง
8. การป้องกันไม่ให้เด็กถูกยุงกัดเป็นเรื่องยาก เนื่องจากยุงลายมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง	3.71	1.24	สูง
รวม	3.87	1.02	สูง

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึง การรับรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีข้อที่กลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ การกางมุ้งให้เด็กนอนเวลากลางวันเป็นเรื่องที่สำคัญต้องปฏิบัติเป็น ประจำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$) = 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)= 0.67 รองลงมา คือ

ในฤดูฝนมีแหล่งน้ำขังมาก ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าในฤดูอื่นๆ ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.76 ส่วนข้อที่คิดว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่ใส่น้ำจะทำให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้อาจถึงแก่ชีวิตได้ ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 2.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.35

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยอื่น

1. ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม

ความพอเพียง	ระดับความพอเพียงของทรัพยากร		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม	2.87	0.90	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ระดับความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 2.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.90

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำแนกรายข้อ

ประเด็นความพอเพียงของทรัพยากร	ระดับความพอเพียง		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1. บ้านของท่านติดมุ้งลวดหรือกางมุ้งนอนเป็นประจำ	3.77	0.53	สูง
2. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง เช่น สเปรย์พ่นยุง ยาจุดกันยุง	2.85	0.96	ปานกลาง
3. ท่านปิดฝาปิดภาชนะใส่น้ำทั้งในบ้านและนอกบ้านหลังใช้งานทุกครั้ง	2.75	1.01	ปานกลาง
4. ท่านใช้เกลือ ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชู สำหรับไว้ใส่ภาชนะเพื่อป้องกันยุงลาย	1.76	1.00	ต่ำ
5. ท่านมีทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดบ้านไว้เสมอ	2.72	1.13	ปานกลาง
6. องค์กรท้องถิ่นในชุมชนของท่านมีการสนับสนุนทรัพยากรหรือสารเคมีในการพ่นกำจัดยุงลาย	3.34	0.76	สูง
รวม	2.87	0.90	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า ระดับความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ข้อที่มีระดับความพอเพียงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ บ้านของท่านติดมุ้งลวดหรือกางมุ้งนอนเป็นประจำ ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.53 และองค์กรท้องถิ่นในชุมชนของท่านมีการสนับสนุนทรัพยากรหรือสารเคมีในการพ่นกำจัดยุงลาย ค่า ($\bar{x}$)=3.34ค่า (S.D)= 0.76 ส่วนข้อที่ระดับความพอเพียงน้อยที่สุด คือ ท่านใช้เกลือ ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชู สำหรับไว้ใส่ภาชนะเพื่อป้องกันยุงลาย ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)=1.76 ค่าเบี่ยงเบน (S.D)= 1.00

2. การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 4.10 ระดับทักษะของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยรวม

ทักษะ	ระดับทักษะในการใช้ทรัพยากร		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
ทักษะในการใช้ทรัพยากรต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม	2.57	0.95	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ระดับทักษะของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)= 2.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)= 0.95

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของการมีทักษะในการใช้ทรัพยากร ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นรายชื่อ

ประเด็นการมีทักษะในการใช้ทรัพยากร	ระดับการมีทักษะ		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1. เวลาที่ท่านสำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ท่านใช้ไฟฉายส่องหาลูกน้ำยุงลายบริเวณขอบภาชนะ	2.23	1.09	ปานกลาง
2. ท่านจะใส่ทรายอะเบท 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร ทุก 3 เดือนทันที โดยไม่ต้องมีใครเตือนหรือแนะนำ	2.47	1.02	ปานกลาง
3. ถ้าไม่มีทรายอะเบท ท่านจะใช้ผงซักฟอก ผสม น้ำใส่ขวดกับข้าวแทนการใช้ทรายอะเบทได้เลย	1.73	0.99	ต่ำ
4. ท่านจะใช้ผ้าปิดโล่งบริเวณประตูทันที ก่อน จะเปิดประตูเข้าออก เพื่อโล่งที่เกาะแฉะประตู	2.28	1.02	ปานกลาง
5. กรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ในกระถางและมีจานรองกระถางต้นไม้ ท่านมักใส่ทรายธรรมชาติลงใน จานรองกระถางต้นไม้ทันที เพื่อดูดซับน้ำ	1.91	0.98	ต่ำ
6. เมื่อมีการพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้าน ท่านจะ เปิดประตูหน้าต่างบ้าน เพื่อให้หมอกควันกระจาย เข้าไปภายในบ้าน	2.96	1.14	ปานกลาง
7. ท่านจะสำรวจแหล่งน้ำขัง รอบๆบ้านทุก 7 วัน	3.10	0.83	สูง
8. ท่านนอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวดทุกคืน เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด	3.85	0.51	สูง
รวม	2.57	0.95	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นรายชื่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะอยู่ในระดับสูง คือ การ นอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวดทุกคืน เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)=3.85 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)= 0.51 รองลงมา คือ การจะสำรวจแหล่งน้ำขัง รอบๆบ้านทุก 7 วัน มี

ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.83 ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีทักษะอยู่ในระดับต่ำ คือ ถ้าไม่มีทรายอะเบท ท่านจะใช้ผงซักฟอก ผสมน้ำใส่ขวดกับข้าวแทนการใช้ทรายอะเบทได้เลย มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 1.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.99 และกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ในกระถางและมีจานรองกระถางต้นไม้ ท่านมักใส่ทรายธรรมชาติลงในจานรองกระถางต้นไม้เพื่อดูดซับน้ำ มีทักษะอยู่ในระดับต่ำ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 1.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.98 นอกนั้นมีทักษะปานกลาง

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยเสริม

การได้รับการสนับสนุนหรือกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข หรือบุคคลใกล้ชิด

ตารางที่ 4.12 ระดับการได้รับคำแนะนำหรือกระตุ้นเตือน และแรงจูงใจต่อการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม

คำแนะนำ/ กระตุ้นเตือน และการได้รับแรงจูงใจ	ระดับการได้รับคำแนะนำ/ กระตุ้นเตือนและการได้รับ แรงจูงใจ		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
การได้รับคำแนะนำหรือกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว (อิทธิพลของคนรอบข้าง) และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า หรือ หน่วยงานราชการโดยรวม	2.76	1.03	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ระดับการได้รับคำแนะนำหรือกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว (อิทธิพลของคนรอบข้าง) และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า หรือหน่วยงานราชการของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 2.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.03

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของการได้รับคำแนะนำหรือ กระตุ้น
เตือน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ จำแนกเป็น
รายชื่อ

ทักษะการใช้ทรัพยากร	ระดับของทักษะ		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1. คนในครอบครัวกระตุ้นเตือนท่าน ให้ปิดประตูมุ้งลวดทุกครั้งเวลาเปิดประตูเข้าออก ทั้งกลางวันและกลางคืน	3.28	1.13	สูง
2. อสม. แนะนำวิธีการสำรวจลูก น้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง ทั้งภายในและภายนอกบ้าน	3.16	1.06	สูง
3. บ้านของท่านเคยได้รับรางวัลบ้านปลอดลูกน้ำยุงลายแลงไข่	1.55	0.99	ต่ำ
4. ผู้ใหญ่บ้านของท่าน ได้มีการแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกโดยผ่านหอกระจายข่าว หรือการประชุมของหมู่บ้าน	3.20	1.01	สูง
5. องค์กรท้องถิ่นในชุมชนของท่านมีการมอบโล่รางวัล/ใบประกาศ แก่หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย	1.71	0.92	ต่ำ
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกทรายอะเบทเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	3.12	1.09	สูง
7. หมู่บ้านของท่านเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชุมชนตำบลนครเจดีย์ปลอดลูกน้ำยุงลาย	3.28	1.00	สูง
รวม	2.76	1.03	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับคำแนะนำ/กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว (อิทธิพลของคนรอบข้าง) และได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า/หน่วยงานราชการต่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับประจำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ สูง คือคนในครอบครัวกระตุ้นเตือนกลุ่มตัวอย่าง ให้ไปประชุมฟัง
 ลวดทุกครั้งเวลาเปิดประตูเข้าออก ทั้งกลางวันและกลางคืนและหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วม
 กิจกรรมรวมพลังชุมชนตำบลนครเจดีย์ปลอดลูกน้ำยุงลาย มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.28 เท่ากันและมีค่า
 เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.13 และ 1.00 ตามลำดับ รองลงมา คือ ผู้ใหญ่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง ได้
 มีการแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกโดยผ่านหอกระจายข่าว หรือ การประชุมของหมู่บ้านค่าเฉลี่ย
 ($\bar{x}$) = 3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.01 ข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการแนะนำ/กระตุ้นเตือน มี
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ คือ บ้านของกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับรางวัลบ้านปลอดลูกน้ำยุงลายแลกไข่
 ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 1.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.99

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ การร่วมวางแผนเพื่อหา
 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก การร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
 ไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การเข้าร่วมประชุมประเมินผลสถานการณ์โรค
 ไข้เลือดออก

ตารางที่ 4.14 ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวม

การป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	3.12	1.12	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
 ไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.12 ค่าเบี่ยงเบน
 มาตรฐาน (S.D) = 1.12

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย($\bar{x}$)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกรายข้อตามการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างจำแนกรายข้อ

การมีส่วนร่วม	ระดับการมีส่วนร่วม		
	($\bar{x}$)	(S.D)	ระดับ
1. การร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	3.03	1.12	ปานกลาง
1.1 มีการพูดคุย เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในการประชุมของหมู่บ้าน	3.57	1.04	ปานกลาง
1.2 ท่านและคนในหมู่บ้าน ช่วยกันคิดและวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	3.01	1.10	ปานกลาง
1.3 หมู่บ้านของท่านมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	3.16	1.09	ปานกลาง
1.4 มีการเสนอแผนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน	3.06	1.15	ปานกลาง
1.5 ท่านได้ร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	2.36	1.23	ปานกลาง
2. การร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	3.11	1.17	ปานกลาง
2.1 ท่านสำรวจภาชนะที่มีน้ำขังว่ามีลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน	3.45	1.16	ปานกลาง
2.2 ท่านใช้สารเคมีพ่นกำจัดยุง เพื่อลดปริมาณยุง	3.24	1.26	ปานกลาง
2.3 ท่านใช้เกลือ หรือ ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชู ใสในจานรองขาตู้ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่	2.01	1.17	ต่ำ
2.4 ท่านให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านและในชุมชนของท่าน	4.11	0.77	สูง

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

การมีส่วนร่วม	ระดับการมีส่วนร่วม		
	$(\bar{x})$	(S.D)	ระดับ
2.5 ท่านปิดประตูหน้าต่างทุกบานและไม่ยอมให้ พ่นหมอกควัน เพราะกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้า ชัก ออกยาก	2.74	1.51	ปานกลาง
3. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	3.50	1.12	ปานกลาง
3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมทำให้ทราบ สถานการณ์และสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก	3.15	1.08	ปานกลาง
3.2 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำให้คนในชุมชน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ	3.63	1.22	ปานกลาง
3.3 การทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ทั้งของชุมชนและหน่วยงาน ราชการ	3.71	1.06	สูง
4. การเข้าร่วมประชุมประเมินผลสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก	2.96	1.04	ปานกลาง
4.1 ท่านได้ร่วมติดตามชนิดและจำนวนภาชนะที่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน	3.20	1.16	ปานกลาง
4.2 ท่านได้ร่วมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ป่วย เป็นโรคไข้เลือดออกในชุมชน	3.10	1.09	ปานกลาง
4.3 ท่านได้ติดตามการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกทั้งในและนอกชุมชน	3.14	0.91	ปานกลาง
4.4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งในและ นอกชุมชน	2.39	0.99	ปานกลาง
รวม	3.12	1.12	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติอยู่ในระดับสูง คือ การให้ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านและในชุมชน ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.77 รองลงมาได้แก่ การทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งของชุมชนและหน่วยงานราชการค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.06 ส่วนการมีส่วนร่วมในการใช้เกลือ หรือ ผงซักฟอก หรือ น้ำส้มสายชู ใส่ในจานรองขาตู้ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ เป็นข้อที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติอยู่ในระดับต่ำ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = 2.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 1.17 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง

ตอนที่ 5 การทดสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากร และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างกับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (n = 374)

ลักษณะทางประชากร	การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค						Chi-square	p-value
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ							26.050	0.000
ชาย	42	20.9	117	58.2	42	20.9		
หญิง	37	21.4	130	75.1	6	3.5		
อายุ							54.716	0.000
18 – 24 ปี	3	13.0	18	78.3	2	8.7		
25 – 34 ปี	6	5.8	67	65.0	30	29.1		
35 – 44 ปี	34	31.8	63	58.9	10	9.3		
45 – 54 ปี	28	29.8	63	67.0	3	3.2		
55 ปีขึ้นไป	8	17.0	36	76.6	3	6.4		

ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

ลักษณะทางประชากร	การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค						Chi-square	p-value
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ระดับการศึกษา							93.101	0.000
ประถมศึกษา	16	13.7	82	70.1	19	16.2		
มัธยมศึกษาตอนต้น	33	47.8	34	49.3	2	2.9		
มัธยมศึกษาตอนปลาย	16	22.9	52	74.3	2	2.9		
อนุปริญญา	11	39.3	17	60.7	0	0		
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	3	4.0	47	62.7	5	33.3		
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	15	100	0	0		
ประกอบอาชีพหลัก							85.086	0.000
- เกษตรกรรม	11	13.5	55	67.9	15	18.5		
- รับจ้าง	59	37.8	92	59.0	5	3.2		
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	3	5.8	39	75.0	10	19.2		
- ค้าขาย	2	6.1	29	87.9	2	6.1		
- แม่บ้าน	1	10	9	90	0	0		
- ว่างาน	1	14.3	5	71.4	1	14.3		
- อื่นๆ	2	5.7	18	51.4	15	42.9		
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน							38.139	0.000
น้อยกว่า 5,000	3	21.4	10	71.4	1	7.1		
5,000 – 10,000	55	30.6	100	55.6	25	13.9		
10,000 – 15,000	8	13.6	49	83.1	2	3.4		

ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

ลักษณะทางประชากร	การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค						Chi-square	p-value
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
15,000 – 20,000	4	5.1	57	72.2	18	22.8		
มากกว่า 20,000	9	21.4	31	73.8	2	4.8		
ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคไข้เลือดออก							8.704	0.013
เคย	5	11.9	36	85.7	1	2.4		
ไม่เคย	74	22.3	211	63.6	47	14.2		

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างปัจจัยนำกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยนำ	r	p-value
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.161**	0.002
- ทักษะคิดต่อการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0.119*	0.022
- การรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.158**	0.002

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

จากตารางที่ 4.17 แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนที่สนใจคือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยเชื้อ	r	p-value
- ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.209**	0.000
- การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.111*	0.032

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

จากตารางที่ 4.18 แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สรุปได้ว่า ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในส่วนของการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้นมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยเสริม	r	p-value
- การได้รับคำแนะนำ/กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม.หรือบุคคลในครอบครัว(อิทธิพลของครอบครัว) และการได้รับแรงจูงใจหรือคำชมจากหัวหน้า/หน่วยงานราชการ	0.682**	0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 4.19 แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การได้รับคำแนะนำ/กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม.หรือ บุคคลในครอบครัว(อิทธิพลของครอบครัว) และการได้รับแรงจูงใจ หรือคำชมจากหัวหน้า/หน่วยงานราชการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01